

**ORDONNANCES DE SUBSTITUTION
THÉRAPEUTIQUE – MÉDICAMENTS PAR
INHALATION – chez l'ADULTE**
Pharmacie

MÉDICAMENTS PAR INHALATION*

corticostéroïdes

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cesser budésonide 0.5 mg | <input type="checkbox"/> fluticasone inh-AD 125 mcg _____ |
| <input type="checkbox"/> Cesser budésonide 1 mg | <input type="checkbox"/> fluticasone inh-AD 250 mcg _____ |

Anticholinergiques

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cesser ipratropium 20 mcg + salbutamol 100 mcg (COMBIVENT) 1 nébule | <input type="checkbox"/> ipratropium inh-AD 20 mcg, 4 bouffées + salbutamol inh-AD 100 mcg, 2 bouffées _____ |
| <input type="checkbox"/> Cesser ipratropium nébule 250 mcg | <input type="checkbox"/> ipratropium inh-AD 20 mcg, 2 bouffées _____ |
| <input type="checkbox"/> Cesser ipratropium nébule 500 mcg | <input type="checkbox"/> ipratropium inh-AD 20 mcg, 4 bouffées _____ |

agonistes bêta-2-adrénergiques sélectifs

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cesser salbutamol 2.5 mg nébule | <input type="checkbox"/> salbutamol inh-AD 100 mcg 2 bouffées _____ |
| <input type="checkbox"/> Cesser salbutamol 5 mg nébule | <input type="checkbox"/> salbutamol inh-AD 100 mcg 4 bouffées _____ |

autres**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cesser béclométhasone inh-AD 100 mcg/dose | <input type="checkbox"/> fluticasone inh-AD 125 mcg (même fréquence) _____ |
| <input type="checkbox"/> Cesser béclométhasone Inh-AD 200 mcg/dose | <input type="checkbox"/> fluticasone inh-AD 250 mcg (même fréquence) _____ |

autres substitutions thérapeutiques

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cesser _____ | <input type="checkbox"/> _____ |
|---------------------------------------|--------------------------------|

Contre-indication :

- Maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle (e.g. arrêt respiratoire grave ou imminent, hypoventilation ou compromis, nébulisation continue, MPOC en phase terminale, insuffisance cardiaque)
- Les patients qui ne sont pas coopératifs ou qui ne sont pas en mesure de suivre les instructions requises pour l'administration par aérosol-doseur (AD) avec une chambre d'espacement (Aérochambre).
- Patients ayant des antécédents de mauvaise réponse avec l'aérosol-doseur et la chambre d'espacement.

Note :

- 1- Les symptômes doivent être surveillés à une fréquence accrue après la substitution, car les changements dans l'administration de médicaments pourraient altérer l'efficacité et/ou la présence d'effets indésirables
- 2- La nébulisation de l'épinéphrine (VAPONEPHRINE) et d'antibiotique, peut être administré selon l'indication et la pertinence clinique.

*l'administration avec aérosol-doseur doit se faire au moyen d'une chambre d'espacement (Aérochambre)

Légende : inh= inhalation AD = aérosol doseur ** Substitution thérapeutique approuvée au Formulaire des hôpitaux du NB

Signature du pharmacien : _____

Date/heure : _____