Unité pédopsychiatrie Zone 4 et 6 : parcours clinique du patient hospitalisé durant la pandémie COVID-19

Patient admis à l'unité de pédopsychiatrie durant la pandémie

Soins infirmiers : **Évaluation journalière des symptômes cliniques du COVID-19 :** Vérifications des symptômes selon le formulaire RC-196 : COVID-19 – outil de dépistage – patients admis (Fièvre-frissons (> 38) ou antécédent récent de fièvre/frissons, toux, écoulement nasal, congestion nasale, céphalée, essoufflement et mal de gorge)

Patient présente des symptômes reliés à la COVID-19 ?

OUI

NON

Si le patient est seul sur l'unité de pédopsychiatrie : il doit être isolé sur l'unité avec accès à la salle de bain.

1. Patient doit mettre un masque.
2. Aviser le psychiatre traitant/en appel.
3. **Zones 4** : aviser Claudine à la gestion des lits le jours sur semaine et la surveillante le soir/nuit/fin de semaine. **Zone 6** : Aviser la gestionnaire / surveillante
4. Remplir le formulaire RC-196B COVID-19 – outil de dépistage – patients admis et faxer au numéro indiquer sur le formulaire pour la zone.
5. Faire le prélèvement par écouvillon du patient : utiliser les EPI (gouttelettes -contacts) pour toutes interactions avec le patient.

Si le patient n'est pas seul à l'unité de pédopsychiatrie : préparer le transfert du patient pour la pédiatrie dans une chambre d'isolation ou une chambre simple avec salle de bain.

1. Patient doit mettre un masque.
2. Aviser le psychiatre traitant/en appel.
3. **Zones 4** : aviser Claudine à la gestion des lits le jours sur semaine et la surveillante le soir/nuit/fin de semaine. **Zone 6** : Aviser la gestionnaire / surveillante
4. Remplir le formulaire RC-196B COVID-19 – outil de dépistage – patients admis et faxer au numéro indiquer sur le formulaire pour la zone.
5. Faire le prélèvement par écouvillon du patient : utiliser les EPI (gouttelettes – contacts) pour toutes interactions avec le patient.
6. Transférer le patient à l'unité de pédiatrie : utiliser les EPI (gouttelettes -contacts)
7. Suivre les protocoles de transport et de préventions des infections établis

   * Le patient transféré sur l'unité de pédiatrie doit avoir du 1 :1

Résultats de test

Résultat : COVID-19 POSITIF
Patient transféré à l'unité COVID désigné à l'hôpital régional

Résultat : NÉGATIF
Si aucun autre dépistage nécessaire (ex : influenza).
Patient retourne à l'unité de pédopsychiatrie.

Transport du patient COVID-19 confirmé vers l'unité COVID-19
Suivre les protocoles de transport et de préventions des infections établis

Patient admis à l'unité COVID désignée sous les soins du médecin de l'unité COVID

Patient reçoit congé l'unité COVID désignée

Patient pédopsychiatrique doit avoir du 1 :1 sur l'unité COVID

Privilégier le déploiement du personnel pédopsychiatrique ou psychiatrique pour faire le 1 :1

Psychiatre en consultation continue durant le séjour du patient à l'unité COVID

Patient transféré à l'unité de pédopsychiatrie

Patient congédié de la pédopsychiatrie

CONGÉ DÉFINITIF

Mise à jour le 27 avril 2020