



Avant chaque relais de travail

Si vous avez...		Dépistage de la COVID-19, de l'influenza et du VRS
1	<ul style="list-style-type: none"> Écoulement nasal Éternuements Toux Mal de tête Mal de gorge 	<p>Vous n'avez pas besoin de faire un test de dépistage. Portez un masque et pratiquez l'isolement au travail jusqu'à la disparition du symptôme.</p> <p>Si vous avez la fièvre/des frissons/des sueurs ou la perte du goût/de l'odorat, suivez le scénario 3.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Diarrhée (trois fois en 24 heures) 	<p>Vous n'avez pas besoin de faire un test de dépistage. Vous pouvez retourner au travail 48 heures après la dernière diarrhée (liquide).</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> Fièvre/frissons/sueurs Perte du goût Perte de l'odorat 	<p>Ne vous présentez pas au travail, prévenez votre gestionnaire/surveillante et faites un test rapide (« POCT ») pour vérifier s'il s'agit de la COVID-19.</p> <p>Si votre test POCT est négatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>si vos symptômes persistent</u>, refaites un test POCT 24 heures après le premier test. Si ce test est encore négatif, communiquez avec le Service de santé au travail (1-833-249-2003, sante.health@vitalitenb.ca) pour un aiguillage possible (test PCR pour la COVID-19, l'influenza et/ou le VRS).

À noter
 Le travailleur de la santé a évalué s'il avait des symptômes d'infection respiratoire avant de se présenter au travail et qu'il s'engage à respecter les lignes directrices en vigueur dans son établissement/unité.

Before each shift

If you have...		Screening for COVID-19, influenza and RSV
1	<ul style="list-style-type: none"> nasal discharge sneezing cough headache sore throat 	<p>You don't need to take a test. Wear a mask and practise work isolation until your symptoms are gone.</p> <p>If the symptom you have is fever / chills / sweats / loss of taste or smell, follow scenario 3.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> diarrhea (3 times in 24 hours) 	<p>You may return to work 48 hours after your last diarrhea (liquid).</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> fever / chills / sweats loss of taste loss of smell 	<p>Don't come to work. Notify your manager/supervisor and do a COVID-19 rapid test ("POCT").</p> <p>If your POCT test is negative:</p> <ul style="list-style-type: none"> If <u>your symptoms persist</u>, do another rapid test 24 hours after your first test. If this test is also negative, contact Occupational Health (1-833-249-2003, sante.health@vitalitenb.ca) for a possible referral (PCR test for COVID-19, influenza and/or RSV).

Please note

Signing a Self-Assessment at Home Attestation means that a health care worker has assessed themselves for respiratory infection symptoms prior to reporting to work and agrees to comply with the guidelines in force (at their facility/unit).